

[トップに戻る](#)

交通事故などでの頸椎捻挫で、頸椎4方向(2方向)レントゲン撮影は必要ですか？

1. 複数回答できます。

有効投票: 89件

回答	項目	得票	割合
<input type="checkbox"/>	A-1 頸椎4方向撮影は診断的価値が高い	3	3.4%
<input type="checkbox"/>	A-2 頸椎4方向撮影は診断的価値が低い	4	4.5%
<input type="checkbox"/>	B-1 診断的価値があろうとなかろうとルーチンで撮影	17	19.1%
<input type="checkbox"/>	B-2 患者が求める場合のみ撮影	2	2.2%
<input type="checkbox"/>	B-3 頸椎の陳旧性病変を排除するために撮影	8	9.0%
<input type="checkbox"/>	B-4 患者に異常がない事を納得させるために撮影	8	9.0%
<input type="checkbox"/>	C-1 頸椎捻挫の確定診断に頸椎4方向撮影は必須	1	1.1%
<input type="checkbox"/>	C-2 頸椎捻挫の確定診断に頸椎4方向撮影は意味がない	4	4.5%
<input type="checkbox"/>	頸椎損傷除外のため3方向(正面・側面・開口位)が必要	32	36.0%
<input type="checkbox"/>	頸椎損傷除外のため3方向撮影で、病変を見た事がありますか？	4	4.5%
<input type="checkbox"/>	頸椎の不安定性除外のため2方向と前後屈の撮影をする	6	6.7%

[回答する](#)[リセット](#)

項目を追加する場合

[追加](#)[Admin](#)

- WebEnquete -